



คำแนะนำกรมอนามัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในวัด

เตือนภัยสุขภาพประเด็นโรคไข้เลือดออกในวัด

การรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของกรมควบคุมโรค ณ วันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำนวน ๙๓,๐๓๔ ราย เสียชีวิต จำนวน ๘๖ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๑๔๔.๗๖ ต่อแสนประชากร และอัตราป่วยตายร้อยละ ๐.๐๙ และพบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ๓.๓ เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับจากช่วงเวลาเดียวกันในปี ๒๕๕๕ ซึ่งผู้ป่วยตายส่วนใหญ่ร้อยละ ๕๐ เป็นเด็กอายุระหว่าง ๐-๑๔ ปี และการคาดการณ์จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกทั้งหมดในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ อยู่ที่ ๑๒๐,๐๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐ ราย และจะมีจำนวนผู้เสียชีวิตมากถึง ๑๔๐ - ๒๐๐ ราย

แนวทางการดำเนินงาน

๑. ควรมีการเฝ้าระวังพระหรือเณรหรือบุคคลภายในวัด หากพบว่ามีไข้ร่วมกับไอหรือเจ็บคอให้สวมหน้ากากอนามัย แต่หากมีเพียงอาการไข้อย่างเดียวให้สงสัยอาจจะเป็นไข้เลือดออก ควรแนะนำให้ทายากันยุงเพื่อลดการแพร่เชื้อจากผู้ป่วยไปสู่ยุงและยุงไปกัดคนอื่น และควรมีการเฝ้าระวังพระหรือเณรหรือบุคคลภายในวัดที่มีไข้ หากสงสัยเป็นโรคไข้เลือดออกแนะนำให้ไปพบแพทย์
๒. หากพบว่ามีพระหรือเณรหรือบุคคลภายในวัดป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก วัดควรขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งทำลายตัวแก่ยุงลายบริเวณโดยรอบวัด ระยะ ๑๐๐ เมตร พร้อมทั้งรณรงค์ให้บุคลากรภายในวัดและผู้นำร่วมทำบุญและปฏิบัติธรรม จัดเก็บเศษภาชนะรอบวัด เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายต่อไป
๓. ควรมีการกำจัดขยะหรือภาชนะเหลือใช้ที่จะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายในวัด เช่น กระจบียงรถยนต์ กล่องโฟม ฯลฯ
๔. รณรงค์ให้บุคลากรภายในวัด มีกิจกรรมการทำความสะอาดภาชนะที่จะใช้บรรจุน้ำ เช่น แท็งก์เก็บน้ำใช้ แจกันพลูด่าง ซึ่งอาจมีไขูลูกน้ำยุงลายเกาะอยู่ โดยเฉพาะที่กักเก็บน้ำสำหรับรดในท้องส้วมภายในวัด เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
๕. วัดควรปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ ประเด็นตัวชี้วัด “ในบริเวณวัดไม่มีน้ำขังนองและไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย”*

.....

***หมายเหตุ: อ้างอิงจาก”คู่มือแนวทางวัดส่งเสริมสุขภาพ ปี ๒๕๕๖ หน้า ๗๕”**

ข้อมูล ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
สำนักส่งเสริมสุขภาพ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม และศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข